

Effets recherchés

Les antipsychotiques sont principalement utilisés pour contrôler l'ensemble des symptômes psychotiques (symptômes positifs et négatifs).

- Rééquilibrer l'excès de dopamine (un neurotransmetteur dans le cerveau) qui cause les symptômes positifs chez votre proche.

RAPPEL : les symptômes positifs de la schizophrénie comprennent les hallucinations et/ou idées délirantes.

- Rééquilibrer l'insuffisance de dopamine qui cause les symptômes négatifs de la maladie.

RAPPEL : les symptômes négatifs de la schizophrénie comprennent l'isolement social, l'indifférence, la perte d'énergie, etc.

Effets extra-pyramidaux

Les effets extrapyramidaux se manifestent par des contractions ou des tremblements des muscles, par exemple :

- ✓ contraction des muscles des mâchoires ou de la langue
- ✓ contraction des muscles du cou ou du dos
- ✓ raideurs ou tremblement des mains
- ✓ dystonie aiguë (torticolis, spasmes musculaires)
- ✓ balancement des jambes, besoin de marcher (aussi appelé akathisie)

Ces symptômes extrapyramidaux peuvent habituellement être corrigés par une médication antiparkinsonienne (aussi appelé « agent anticholinergique »). Les molécules les plus souvent utilisées sont les suivantes :

Kémadrin® Codentin® Artane®

APAMM-RS



10, boulevard Churchill, suite 206
Greenfield Park, Qc, J4V 2L7
450.766.0524

info@apammrs.org
www.apammrs.org



ASSOCIATION DES PARENTS
ET AMIS DE LA PERSONNE
ATTEINTE DE MALADIE
MENTALE – RIVE-SUD



Mécanisme d'action, effets recherchés et principaux effets secondaires

Utilisation / traitement

Les antipsychotiques sont généralement prescrits dans le traitement de la schizophrénie, le trouble schizo-affectif, la dépression psychotique agitée, la psychose brève, la confusion mentale, le trouble délirant, l'anxiété, le trouble bipolaire (lorsque nécessaire) et l'agitation (tranquillisant).

On les retrouve généralement sous forme de comprimés, mais ils sont aussi offerts en injection. L'injection offre une action longue (2 à 4 semaines) et est souvent utilisée dans les cas où la personne atteinte est moins conciliante à la médication ou s'il y a des oublis fréquents.

Pour en savoir plus

Vous pouvez demander un feuillet explicatif de la médication de votre proche à votre pharmacien. Ce feuillet décrit clairement l'action, les contre-indications et les effets secondaires propres à la molécule utilisée par votre proche atteint.

Principaux effets secondaires

Antipsychotiques TYPIQUES (anciens)

Cette catégorie d'antipsychotiques comprend les marques déposées suivantes :

Nozinan® Largactil® Mellaril®
Neureptil® Majeptil® Moditen®
Trilafon® Stélazine® Haldol®
Orap® Loxapac®

EFFETS SECONDAIRES :

- somnolence, léthargie (nonchalance)
- bouche sèche ou hypersalivation
- constipation
- sensibilité de la peau au soleil (surtout Largactil®)
- baisse soudaine de la tension artérielle au lever
- vertiges et sensations de faiblesse
- difficultés à uriner, difficultés sexuelles
- vision brouillée et sensibilité à la lumière
- effets extrapyramidaux*

Principaux effets secondaires

Antipsychotiques ATYPIQUES (nouveaux)

Cette catégorie d'antipsychotiques comprend les marques déposées suivantes :

Clozaril® Zyprexa®
Seroquel® Risperdal®
Abilify®

EFFETS SECONDAIRES :

- troubles au niveau du sang nécessitant des analyses sanguines (Clozaril®)
- somnolence importante au début du traitement
- hypersalivation ou bouche sèche
- gain de poids
- baisse soudaine de la tension artérielle au lever
- peu ou pas d'effets extrapyramidaux*
- les effets secondaires sont moins présents avec les atypiques, ou présents moins longtemps

Il est très important d'informer le médecin traitant de tous les effets secondaires afin que ce dernier évalue la pertinence de continuer le traitement ou propose d'autres alternatives ou molécules.

*Voir la définition des effets extrapyramidaux à l'endos de ce dépliant.